

患者ID:@PATIENTID

2020.10.1作成

@PATIENTNAME 様 非小細胞肺化療(キイトルーダ+ペメトレキセド)

2024.6.6改訂


指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m ² (DuBois式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	パンビタン末 1g 1×朝食後	連日内服	内服 ペメトレキセド投与1週間前から連日内服、ペメトレキセド最終投与から22日まで連日内服		
②	フレスミンS注 1A	9週間ごと	筋注 ペメトレキセド最終投与から22日まで9週ごとに投与		
③	生理食塩水 500mL 1V	ルートキープ	点滴		
④	グラニセトロン3mgバッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴		
⑤	キイトルーダ200mg 生食 50mL 1V ()mg/body	30分	点滴	フィルター使用	
⑥	ペメトレキセド 500mg/m ² 生食 100mL ()mg/body #VALUE! 計算値	12分	ルートキープの生食でフラッシュ後点滴		

投与手順



スケジュール



注意

ペメトレキセドは生理食塩水以外の輸液との配合は不可(生食フラッシュが必要)