

患者ID:@PATIENTID

2024.8.8作成

@PATIENTNAME様


## 乳化療(Weeklyパクリタキセル+トラスツズマブ)

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	WEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup> (DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生理食塩水500mL	ルートキープ	点滴	
②	レスタミンコーウ5錠		内服	
③	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg 3A	30分	点滴	
④	生理食塩水100mL ファモチジン 1A	30分	点滴	
⑤	5%糖液250mL パクリタキセル 80mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	60分	点滴	フィルター使用
⑥	生理食塩水250mL トラスツズマブ 4mg/kg(初回のみ) トラスツズマブ 2mg/kg(2回目以降) ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降	90分 2回目から30分	点滴	



**スケジュール**  
毎週1回投与する



**注意**

HER2陽性患者のみ使用可  
心エコーで心駆出率50%以上  
トラスツズマブ投与中はInfusion reactionに注意  
トラスツズマブ投与中はInfusion reactionに注意(初回投与の40%に発現、0.3%にアナフィラキシーショック)  
パクリタキセル使用時には必ず、フィルターを使用する。  
パクリタキセルはアルコールが入っているため、車の運転は控える。

**治療成績**

奏効率は57-62% (癌研究会有明病院最新化学療法レジメンより)  
無進行期間は15ヶ月