

患者ID:@PATIENTID

@PATIENTNAME 様

## 血液化療悪性リンパ腫 A-CHP

2023.12.18作成

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_E	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>

(DuBoisの式)


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生理食塩液500mL	ルートキープ	点滴	
②	パロノセトロンIV 生食50mL	30分	点滴	
③	プレドニン注100mg 生食50mL	30分	点滴	
④	生理食塩液100mL ドキソルビシン注用 50mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	30分	点滴	
⑤	カロナール300mg2錠	内服	内服	
⑥	生食 250mL 注射用エンドキサン 750mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	60分	点滴	
⑦	ポララミン注1A 生食50mL	15分	点滴	
⑧	生理食塩液 100mL 注射用水(1Vあたり10.5mLで溶解) アドセトリス注用 1.8mg/kg ( )mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	30分	点滴	
⑨	プレドニン錠100mg	day2-5	内服	

## 投与手順



## スケジュール



・ドキソルビシン注は起瘻死性抗がん剤であるため、確実にルート確保を行い、注射部位の症状に注意する。

- ・ドキソルビシン注は重篤な心筋障害の報告があるため定期的な心電図、心エコーを実施すること。
- ・ドキソルビシンの総投与量は500mg/m<sup>2</sup>以下にすること。