

患者ID:@PATIENTID

2009.10.31作成

@PATIENTNAME 様

大腸化療 (XELOXアレルギーレジメン)

2024.8.2改訂

| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |

| | | |
|------|-----------------|----|
| 身長 | \$HEIGHT01_Doc | cm |
| 体重 | \$WHEIGHT01_Doc | kg |
| 体表面積 | #VALUE! | m2 |


実施印

| | 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | |
|---|--|--------------------|------|------------------------------------|
| ① | カペシタビン (朝(夕(#VALUE! 計算値 最小単位300mg 下記投与量を参照 | 2週間内服 (day1-14) | 内服 | カペシタビン 服用開始(2 週間服用1 週間休み) |
| ② | グラニセトロン3mg1パック デカドロン3.3mg3A | 30分 | 点滴 | |
| ③ | ポララミン1A 生食50ml | 15分 | 点滴 | |
| ④ | 5%糖液500mL デカドロン3.3mg2A オキサリプラチナ130mg/m2 (#VALUE! 計算値 最小単位10mg | 4時間 | 点滴 | |


投与手順

day1

カペシタビン内服開始(2週間服用1週間休薬)



スケジュール



カペシタビンの投与方法

| 体表面積 | 1回服用量 | 1日量 |
|----------------|--------|--------|
| 1. 36未満 | 1200mg | 2400mg |
| 1. 36以上1. 66未満 | 1500mg | 3000mg |
| 1. 66以上1. 96未満 | 1800mg | 3600mg |
| 1. 96以上 | 2100mg | 4200mg |

カペシタビンの減量投与方法

| 体表面積 | 1段階減量 | | 2段階減量 | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| | 1回服用量 | 1日量 | 1回服用量 | 1日量 |
| 1. 41未満 | 900mg | 1800mg | | |
| 1. 41以上1. 51未満 | | | 600mg | 1200mg |
| 1. 51以上1. 81未満 | 1200mg | 2400mg | | |
| 1. 81以上2. 11未満 | | | 900mg | 1800mg |
| 2. 11以上 | 1500mg | 3000mg | 1200mg | 2400mg |

n=311

| 副作用 (%) | grade1 | grade2 | grade3 | grade4 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 好中球減少 | <1 | 13 | 5 | 0 |
| 下痢 | 20 | 17 | 19 | <1 |
| 恶心/嘔吐 | 56 | 40 | 7 | 0 |
| 口内炎 | 9 | 4 | <1 | - |
| HFS | 8 | 11 | 4 | - |
| 疲労 | 17 | 17 | 7 | - |
| 感覺異常 | 24 | 5 | 4 | - |
| 末梢神經障害 | 7 | 5 | <1 | - |

NO16967試験

臨床成績

MST

CAPOX(18.8ヶ月) vs FOLFOX4(17.7ヶ月)

HR:0.87