

患者ID:@PATIENTID

2014.12.12作成

@PATIENTNAME 様

血液化療ABVD療法

2024.8.1改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_L	kg
体表面積	#VALUE!	m2 (DuBoisの式)

実施印


day1 day15

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	生理食塩液 250mL	ルートキープ	点滴		
②	パロノセトロン注1V デカドロン注3.3mg3A ホスアプレビタント1V 生食100mL	30分	点滴		
③	生食100mL ドキシソルピシン 25mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	30分	点滴		
④	生理食塩液 100mL プレオ 9mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body 最小単位1mg #VALUE! 計算値	30分	点滴		
⑤	生理食塩液 50mL エクザール6mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body 最小単位1mg #VALUE! 計算値	15分	点滴		
⑥	生食500mL ダカルバジン注用375mg/m <sup>2</sup> 注射用水で溶解して混注 ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	120分	点滴	ルートも遮光して	ルートも遮光して

投与手順



スケジュール



注意事項

ダカルバジン<sup>®</sup>は調製後、遮光。ルートも遮光して投与。