

患者ID:@PATIENTID

2009.11.13作成

@PATIENTNAME 様

肺化療(ゲムシタビン+カルボプラチニ)

2025.9.4改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	WEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m ²
年齢		歳
性別		
血清クレアチニン		mg/dL
Ccr		mL/min

(DuBois式)


(Cockcroft&Gault式(+0.2補正))

実施印


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	生食500mL	ルートキープ	点滴		
②	グラニセトロン3mgパック デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴		
③	カルボプラチニ AUC5 生食 250mL (#VALUE!) mg/body 電子カルテで計算	60分	点滴		
④	ゲムシタビン 1000mg/m ² 生食100mL (#VALUE!) mg/body 計算値	30分	点滴		

投与手順


day1



day8



スケジュール



day8の時は血小板の値に要注意、特に7.5万/ μ Lを下回る場合や、治療前よりも急激な減少が認められた場合は要注意

yamamotoの報告によれば、Grade3以上の血小板減少が81.3%でありの症例に血小板輸血を実施 癌化学療法ハンドブック2009 p74参考