

患者ID:@PATIENTID

2025.1.17作成

@PATIENTNAME様

## 乳化療(ページェタ+トラスツズマブ+エリプリン)



指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	WEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>

(DuBoisの式)

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	生理食塩水100mL	ルートキープ	点滴		
②	生理食塩液250mL ページェタ点滴静注 840mg/body (初回のみ) 420mg/body (2回目以降) ( )mg/body	初回 60分 2回目以降30分	点滴		
	経過観察	初回60分 2回目以降30分	経過観察		
③	生理食塩水250mL トラスツズマブ 8mg/kg(初回のみ) トラスツズマブ 6mg/kg(2回目以降) ( )mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降	初回90分 2回目以降30分	点滴		
④	グラニセトロン3mg 1バッグ	30分	点滴		
⑤	キープの生食でルートフラッシュ	フラッシュ	フラッシュ		
⑥	生食20mL エリプリン1.4mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body #VALUE! 計算値	2~5分	静注		

## 投与手順





### 注意

HER2陽性患者のみ使用可

選択基準	ベースラインのLVEF $\geq 50\%$
除外基準	コントロール不良の高血圧(Bp150/100以上) 不安定狭心症 うつ血性心不全の既往 治療を要する重篤な不整脈(心房細動、発作性上室性頻脈を除く) 6ヶ月以内の心筋梗塞 術前/術後療法でのトラスツズマブ投与中または投与後にLVEF<50%