

患者ID:@PATIENTID

2010.3.20作成 2024.8.2改訂

@PATIENTNAME 様

## 大腸化療(Bmab + sLV5FU2)


指示者	@USERNAME	身長	HEIGHT01_Dc	cm
コース数		体重	WEIGHT01_D	kg
		体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>

(DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	グラニセトロンパック デカドロン3.3mg 2A プリンペラン1A	30分	点滴	
②	ベバシズマブ5mg/kg 生食100mL (#VALUE! mg/body 計算値)	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	点滴	
③	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖100mL (#VALUE! mg/body 計算値)	2時間	点滴	
④	5FU 400mg/m <sup>2</sup> (#VALUE! mg/body 計算値)	5分	静注	
⑤	5FU 2400mg/m <sup>2</sup> +生食を加え全量を230mL (処方は生食500mL) (#VALUE! mg/body 計算値)	46時間	インフューザー ポンプLV5に 入れて全量を 230mLに調製	

## 投与手順



## 注意

副作用が強い際は、原則80%量で、その時はレボホリナート、アバスチン減量の必要なし。

ベバシズマブ投与後は頻回に血圧測定を行う。

原則として手術後28日以内の投与は不可。

## 副作用

#NAME?

消化管穿孔1.7%、創傷治癒遅延、出血3.7%、動脈血栓症1.5~9%、静脈血栓症9.4%  
高血圧性脳症・高血圧クリーゼ3.2~15%

## スケジュール

