

患者ID:@PATIENTID

2024.8.1

@PATIENTNAME様

乳化療(ページエタ+トラスツズマブ+Weeklyパクリタキセル)


| | |
|------|-----------|
| 指示者 | @USERNAME |
| コース数 | |

| | | |
|------|------------|------------------------------|
| 身長 | HEIGHT01_D | cm |
| 体重 | HEIGHT01_D | kg |
| 体表面積 | #VALUE! | m ² (DuBoisの式) |

実施印

day1 day8 day15

| 薬物/実際の投与量 | 投与時間 | 投与経路 | day1 | day8 | day15 |
|--|----------------------|------|---------|---------|---------|
| ① 生理食塩水500mL | ルートキープ | 点滴 | | | |
| ② 生理食塩液250mL ページエタ点滴静注 840mg/body (初回のみ) 420mg/body (2回目以降) ()mg/body | 初回 60分 2回目以降30分 | 点滴 | | | |
| ③ レスタミンコーワ5錠 | | 内服 | | | |
| ④ グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg3A | 30分 | 点滴 | | | |
| ⑤ 生理食塩水100mL ファモチジン 1A | 30分 | 点滴 | | | |
| ⑥ 5%糖液250mL パクリタキセル 80mg/m ² ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 | 60分 | 点滴 | フィルター使用 | フィルター使用 | フィルター使用 |
| ⑦ 生理食塩水250mL トラスツズマブ 8mg/kg(初回のみ) トラスツズマブ 6mg/kg(2回目以降) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値 初回 #VALUE! 2回目以降 | 初回90分 2回目以降30分でも可 | 点滴 | | | |



注意

HER2陽性患者のみ使用可

| | |
|------|---|
| 選択基準 | ベースラインのLVEF $\geq 50\%$ |
| 除外基準 | コントロール不良の高血圧 (Bp150/100以上) 不安定狭心症 うつ血性心不全の既往 治療を要する重篤な不整脈 (心房細動、発作性上室性頻脈を除く) 6か月以内の心筋梗塞 術前/術後療法でのハーセプチニン投与中または投与後にLVEF < 50% |

パージェタ、トラスツズマブ投与中はInfusion reactionに注意

| Infusion reaction 発現率 | パージェタ+T+D | | プラセボ+T+D | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 全grade | grade 3-5 | 全grade | grade 3-5 |
| | 13.8% | 0.3% | 15.4% | 1.0% |