

患者ID:@PATIENTID

2011.5.17作成

@PATIENTNAME 様

非小細胞肺化療(ビノレルビン)

2025.9.10改訂

指示者	@USERNAME	身長	HEIGHT01_D	cm
コース数		体重	HEIGHT01_I	kg
		体表面積	#VALUE!	m2 (DuBoisの式)


実施印

day1day8day15


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路			
①	5%糖液250mL	ルートキープ	点滴			
②	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg1A	30分	点滴			
③	生食50mL ロゼウス 25mg/m2 ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	全開 (5分以内)	点滴			
④	生食100mL	全開	点滴			

投与手順

* 血管外漏出に注意



スケジュール



主な副作用

血液毒性

Grade 3/4(%)	
好中球減少	14/11
血小板減少	1/0
貧血	3/1

非血液毒性

Grade 3/4(%)	
嘔気・嘔吐	1/0
便秘	3/1
肺障害	1/0
全身倦怠感	7/0

治療成績

奏効率 18%

生存期間中央値 9%

1年生存率 38%

参考文献

最新化学療法レジメー肺癌ー p30-31