

患者ID:@PATIENTID

@PATIENTNAME 様 大腸化療Bmab+mFOLFOXIRI

2019.3.7作成  
2024.8.3改定

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_Dc	cm
体重	WEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>

(DuBoisの式)

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	パロノセトロン1V デカドロン3.3mg3A ホスアプレピタント1V 生理食塩水100mL	30分	点滴	
②	ベニシズマブ5mg/kg 生食100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	点滴	
③	イリノテカーン 150mg/m <sup>2</sup> 5%糖液250mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	60分	点滴	
④	オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> 5%糖液250mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	120分	点滴	
⑤	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 5%糖液100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	120分	点滴	
⑥	5FU 2400mg/m <sup>2</sup> +生食を加え全量を230mL (処方は生食250mL) ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	46時間 インフューザー ポンプで	点滴	
⑦	デカドロン(0.5mg)8錠2×朝食後3日分 day2-4		内服	day2-4に服用

上ポテシンの副作用(下痢)が懸念される場合は以下の内服も考慮

ブスコパン3錠3×1日分(1日目)


炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1~4日目)

ウルツ3錠3×4日分(1~4日目)

カマグ500mg3錠3×4日分(1~4日目)

ロペラミド錠1錠1×下痢時

半夏しゃ心湯 3P3× 每食前

**投与手順****スケジュール**