

患者ID:@PATIENTID

2024.6.16作成

@PATIENTNAME 様

## 胃化療（ビロイ+FOLFOX療法）

2024.9.3改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	ポララミン注1A 生食50mL	15分	点滴	
②	パロノセトロン1V ホスアプレビタント1V デカドロン注3.3mg2A 生食100mL	30分	点滴	
③	ビロイ800mg/m <sup>2</sup> (初回) 400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降) 生食500mL 注射用水100mL(ビロイ溶解用) ( )mg/body  #VALUE! 初回 #VALUE! 2回目以降	投与開始30分まで 60mL/hr 投与開始30分以後 120mL/hr	点滴	
④	オキサリプラチナ85mg/m <sup>2</sup> 5%糖液250mL ( )mg/body  #VALUE! 計算値	2時間	点滴	
⑤	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 5%ブドウ糖100mL ( )mg/body  #VALUE! 計算値	2時間	点滴	
⑥	5FU 400mg/m <sup>2</sup> ( )mg/body  #VALUE! 計算値	5分	静注	
⑦	5FU 2400mg/m <sup>2</sup> +生食を加え全量を230mL (処方は生食500mL) ( )mg/body  #VALUE! 計算値	46時間	インフューザーポン PLV5に入れて全 量を230mLに調製	

## 投与手順

day1



## 注意

5%糖液以外でオキサリプラチナは分解されやすい。

## スケジュール

