

患者ID:@PATIENTID

2010.6.25作成

@PATIENTNAME 様

大腸化療(ベクティビックス+CPT-11)

2024.1.11改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_Dc	cm
体重	VHEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m ² (DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生理食塩液500mL	ルートキープ	点滴	
②	ポララミン注 生食50mL	15分	点滴	
③	グラニセトロンバッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴	
④	ベクティビックス 6mg/kg 生食100mL (#VALUE!)mg/body #VALUE! 計算値	60分	点滴	フィルター使用
⑤	生食50mL	15分	点滴	
⑥	トポテシン 150mg/m ² 5%糖液250mL (#VALUE!)mg/body #VALUE! 計算値	90分	点滴	

トポテシンの下痢・腹痛が起こる場合は以下を追加

ブスコパン3錠3×1日分(1日目)

炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1~4日目)


ウルソ3錠3×4日分(1~4日目)

カマグ1.5g3×4日分(1~4日目)

ロペミン1C1×下痢時

半夏しや心湯 3P3× 每食前


投与手順



注意

ベクティビックスは生食以外との配合はできない。⑤の生食はルート内フラッシュ及び経過観察目的で行う。

スケジュール



<ベクティビックス単剤>

副作用発現

ざ瘡 65%	低Mg血症 28%	下痢 15%
皮膚乾燥 60%	疲労 26%	嘔吐 15%
発疹 55%	口内炎 25%	紅斑 13%
搔痒 42%	食欲不振 20%	
爪周囲炎 35%		