

患者ID:@PATIENTID

2011.6.13作成

@PATIENTNAME 様

## 乳化療(ビノレルビン)

2025.9.10改定

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_I	kg
体表面積	#VALUE!	m2 (DuBoisの式)


実施印

day1 day8


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	5%糖液250mL	ルートキープ	点滴		
②	グラニセトロン3mg 1バッグ デカドロン3.3mg1A	30分	点滴		
③	生食50mL ロゼウス 25mg/m2 ( 最小単位5mg #VALUE!	全開 (5分以内) 計算値	点滴		
④	生食100mL	全開	点滴		

## 投与手順

\*血管外漏出に注意



## スケジュール



## 主な副作用

血液毒性

Grade 3以上(%)	
好中球減少	74
FN	12
Hb低下	10

非血液毒性

Grade 3以上(%)	
嘔気・嘔吐	2
便秘	2
全身倦怠感	4

## 治療成績

奏効率 35-50%(ファーストライン)、20% (アンスラサイクリン・タキサン系抗がん剤の治療歴がある症例)

## 参考文献

最新化学療法レジメンー乳癌－ p44-45