


指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>
年齢		歳
性別		
血清クレアチニン		mg/dL
Ccr		mL/min


(DuBois式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	バンピタン末 1g 1×朝食後	連日内服	へ <sup>°</sup> メトレキセド <sup>°</sup> 投与1週間前から連日内服、へ <sup>°</sup> メトレキセド <sup>°</sup> 最終投与から22日まで連日内服		
②	フレスミンS注 1A	9週間ごと	へ <sup>°</sup> メトレキセド <sup>°</sup> 最終投与から22日まで9週ごとに投与		
③	生理食塩水 500mL 1V	ルートキープ	点滴		
④	グラニセトロン3mgバッグ デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴		
⑤	アバスチン15mg/kg+生食100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値 最小単位10mg	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴		
⑥	ペメトレキセド 500mg/m <sup>2</sup> 生食 100mL ( )mg/body #VALUE! 計算値	12分	ルートキープの生食でフラッシュ後 点滴		
⑦	カルボプラチン ACU6 生食 250mL ( )mg/body #VALUE! 計算値	60分	点滴		



## スケジュール



注意  
ペメレキシドは生理食塩水以外の輸液との配合は不可(生食フラッシュが必要)