

@PATIENTNAME様

乳化療(ページェタ+トラスツズマブ)



指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_I	kg
体表面積	#VALUE!	m ² (DuBoisの式)

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生理食塩水100mL	ルートキープ	点滴	
②	生理食塩液100mL デカドロン3.3mg 2A	30分	点滴	
③	生理食塩液250mL ページェタ点滴静注 420mg/body (2回目以降) ()mg/body	2回目以降30分 (問題ある場合は1時間)	点滴	
④	生理食塩水250mL トラスツズマブ 6mg/kg(2回目以降) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE!	2回目以降30分 (問題ある場合は90分) 2回目以降	点滴	

投与手順

スケジュール
3週ごと投与する

注意

HER2陽性患者のみ使用可

選択基準	ベースラインのLVEF \geq 50%
除外基準	コントロール不良の高血圧(Bp150/100以上) 不安定狭心症 うつ血性心不全の既往 治療を要する重篤な不整脈(心房細動、発作性上室性頻脈を除く) 6か月以内の心筋梗塞 術前/術後療法でのハーセプチニン投与中または投与後にLVEF<50%

ページェタ、ハーセプチニン投与中はInfusion reactionに注意

	ページェタ+T+D	プラセボ+T+D
Infusion reaction	全grade	grade 3-5
発現率	13.8%	0.3%

全grade

grade 3-5

全grade

grade 3-5

13.8%

0.3%

15.4%

1.0%