

患者ID:@PATIENTID

2011.8.12作成
2025.8.1改訂

@PATIENTNAME 様 大腸化療 (ベクティビックス+IRIS)

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	WEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m ²

実施印

day1 day15

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路		
①	生理食塩水500mL	ルートキープ	点滴		
②	ポララミン注 生食50mL	15分	点滴		
③	グランセトロンバッグ デカドロン3.3mg2A	30分	点滴		
④	ベクティビックス 6mg/kg 生理食塩水100mL ()mg/body #VALUE!	60分	点滴	フィルター使用	フィルター使用
⑤	生食50mL	15分	点滴		
⑥	イリノテカン100mg/m ² 5%糖液250mL ()mg/body #VALUE! 計算値	90分	点滴		
⑦	エスワン80mg/m ² ()mg/body #VALUE! 通常初回上限は 120mg BSAが大きければ 140mgまで増量可	2×朝夕食後 2週間服用2週間休薬 (day1-14)	内服		

投与手順



注意

ベクティビックスは生食以外との配合は不可、⑤の生食はルートフラッシュ及び経過観察目的で行う。

スケジュール

