

患者ID:@PATIENTID

2014.10.8作成

@PATIENTNAME 様

大腸化療 (Bmab+カペシタビン療法)

2024.8.2改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m2

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	カペシタビン ()mg/body 2× 朝()mg 夕()mg #VALUE! <small>計算値 最小単位300mg</small>	2週間内服 (day1-14)	内服	カペシタビン服用開始 (2週間服用 1週間休み)
②	ベバシズマブ7.5mg/kg+生食100mL ()mg/body #VALUE! <small>計算値 最小単位10mg</small>	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴	

内服・外用


ピドキサール錠 3T3 × 食後(連日)

ウレパールクリーム 1日5回塗布(手足に) 市販のハンドクリームを使用している場合はそれでも可

投与手順

day1

カペシタビン内服開始(2週間服用1週間休薬)

**スケジュール****カペシタビンの投与方法**

体表面積	1回服用量	1日量
1. 36未満	1200mg	2400mg
1. 36以上1. 66未満	1500mg	3000mg
1. 66以上1. 96未満	1800mg	3600mg
1. 96以上	2100mg	4200mg

カペシタビンの減量投与方法

体表面積	1段階減量		2段階減量	
	1回服用量	1日量	1回服用量	1日量
1. 41未満	900mg	1800mg	600mg	1200mg
1. 41以上1. 51未満	1200mg	2400mg	900mg	1800mg
1. 51以上1. 81未満				
1. 81以上2. 11未満	1500mg	3000mg	1200mg	2400mg
2. 11以上				

臨床成績

CR:2% PR:17% SD:55%

AVEX試験

HR:0.79

有害事象	シロード・アバランチ群(n=154), n(%)		シロード群(n=136), n(%)	
	Grade 3	Grade 4(UL)	Grade 3	Grade 4(UL)
アバランチに特徴的な有害事象				
出血	0	0	0	3(1)
頭痛	6(2)	0	2(1)	0
神経血管収縮イベント	5(2)	5(6)	4(3)	2(1)
虚血	2(1)	0	0	0
神経血管収縮イベント	2(1)	3(2)	1(1)	0
神経血管収縮	0	0	0	0
神経血管増強	0	0	1(1)	0
うつ	0	0	0	3(1)
うつ・焦虑・不安	0	0	0	0
嘔吐	0	0	0	0
消化管疾患	0	0	0	0
可逆性後台視網膜症候群	0	0	0	0
シロードに特徴的な有害事象				
手足痙攣群	21(16)	0	9(7)	0
下肢	8(6)	1(0)	7(5)	2(1)
無力感	6(4)	1(1)	4(3)	3(1)
震宮	4(3)	1(0)	1(1)	0
悪心	1(1)	0	0	0
嘔吐	2(2)	0	2(1)	0
口内炎	0	0	1(1)	0
肝中性減少	0	1(1)	1(1)	0

Cunningham D, et al. Cancer Discov 14: 1077-1085, 2012.