

患者ID:@PATIENTID

2025.7.9作成


@PATIENTNAME 様

食道化療(術前DCF療法)


指示者 コース数	@USERNAME	身長	HEIGHT01_D	cm	#VALUE! (DuBoisの式)	実施日				
		体重	HEIGHT01_I	kg		day1	day2	day3	day4	day5
		体表面積		m ² <th data-kind="ghost"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
①	生食1000mL 5FU 750mg/m ² (最小単位10mg #VALUE! 計算値	24時間	点滴							
②	ペロセトロン1V ホスアブレピタントV デカドロン(3.3mg)3A 生食100mL	30分	点滴							
③	5%糖液500mL ドセタキセル 70mg/m ² (最小単位5mg #VALUE! 計算値	2時間	点滴							
④	ソルデム1 500mLmL 硫酸マグネシウム8mL KCL10mL(0.5A)	1時間	点滴							
⑤	マンニトール200mL(IVから100mL捨てる) 生理食塩水250mL	30分	点滴							
⑥	ランダ 70mg/m ² (最小単位5mg #VALUE! 計算値	2時間	点滴							
⑦	ソルデム1 500mL KCL10mL(0.5A)	1時間	点滴							
⑧	生食100mL デカドロン(3.3mg)3A	30分	点滴							
⑨	レボフロキサン錠500mg1錠1×朝食後 (腎機能の応じて調節)	day5-15	内服							day5-15

投与手順


day1



day2-5



スケジュール



注意

初回より、骨髄抑制の発現頻度が高い。
高頻度の脱毛あるため、事前の説明が必要。
day2-5:朝食前体重が開始前(入院時)比+2kgまたは1日尿量2L/日以下の時、フロセミド注(20mg)を0.5A静注