

患者ID:@PATIENTID

2009.4.10作成

@PATIENTNAME 様 大腸化療(Bmab+FOLFIRI)

2024.8.2改訂

指示者	@USERNAME
コース数	


身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_I	kg
体表面積	#VALUE!	m <sup>2</sup>

(DuBoisの式)

実施印


	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	グラニセトロン3mgバッグ1V デカドロン3.3mg2A プリンペラン1A	30分	点滴	
②	ヘパシスマブ5mg/kg+生食100mL (#VALUE!)mg/body 計算値 最小単位10mg	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴	
③	イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> 5%糖液250mL (#VALUE!)mg/body 計算値 最小単位10mg	90分	点滴	
④	レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> 5%糖液100mL (#VALUE!)mg/body 計算値 最小単位10mg	120分	点滴	
⑤	5FU 400mg/m <sup>2</sup> (#VALUE!)mg/body 計算値 最小単位10mg	5分	点滴	
⑥	5FU 2400mg/m <sup>2</sup> +生食を加え全量を230mL (処方は生食500mL) (#VALUE!)mg/body 計算値 最小単位10mg	46時間 インフューザー ポンプで	点滴	

## 投与手順





## スケジュール



## 内服

イリノテカンの下痢・腹痛が起こる場合は以下を追加

ブスコパン3錠3×1日分(1日目)  
炭酸水素ナトリウム1.8g3×4日分(1~4日目)  
ウルソ3錠3×4日分(1~4日目)  
カマグ1.5g3×4日分(1~4日目)  
ロペラミド錠1錠×下痢時  
半夏しゃ心湯 3P3× 每食前

## 効果

Bmab併用FOLFIRI療法の臨床第2相試験(AVIRI)  
前治療歴の無い転移性結腸・直腸癌患者 n = 209

全奏効	111 (53.1%)
CR	7 (3.3%)
PR	104
SD	68 (32.5%)

## 副作用

グレード3/4の有害事象 n=209

出血	3.80%
高血圧	3.80%
蛋白尿	2.40%
動脈血栓塞栓症	4.80%
消化管穿孔	2.40%
創傷治癒合併症	0.50%

引用 Sobrero, et al. ASCO 2007