

患者ID:@PATIENTID

2011.10.6作成

@PATIENTNAME 様

大腸化療 (Bmab + CAPIRI療法)

2024.8.7改訂

指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m ²

実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	カペシタビン (朝(夕(#VALUE! 計算値 最小単位300mg	2週間内服 (day1-14)	内服	カペシタビン 服用開始(2 週間服用1 週間休み)
②	グラニセトロン3mg1バッグ デカドロン3.3mg2A	30分	点滴	
③	ベバシズマブ 7.5mg/kg+生食100mL (#VALUE! 計算値 最小単位10mg	初回は90分 2回目は60分でも良い 3回目以降は30分でも良い	点滴	
④	5%糖液250mL イリノテカシン200mg/m ² (#VALUE! 計算値 最小単位10mg	90分	点滴	

内服・外用

ピドキサール錠 3T3×食後(連日)

ウレパールクリーム 1日5回塗布(手足に) 市販のハンドクリームを使用している場合はそれでも可

投与手順

day1

カペシタビン内服開始(2週間服用1週間休薬)



スケジュール

