

患者ID:@PATIENTID

2024.10.21作成

@PATIENTNAME 様

胃化療 (SP+キイトルーダ<sup>®</sup>療法)

|      |           |
|------|-----------|
| 指示者  | @USERNAME |
| コース数 |           |


|      |                |    |
|------|----------------|----|
| 身長   | \$HEIGHT01_Doc | cm |
| 体重   | \$WEIGHT01_Doc | kg |
| 体表面積 | #VALUE!        | m2 |

実施印

|   | 薬物/実際の投与量  | 投与時間               | 投与経路 | day1                 | day2      | day3 |
|---|--|--------------------|------|----------------------|-----------|------|
| ① | エスワン<br>( )mg/body 2×<br>朝( )mg<br>夕( )mg<br>#VALUE! 計算値<br>通常初回上限は120mg | 2週間内服<br>(day1-14) | 内服   | エスワン服用開始(2週間服用1週間休み) |           |      |
| ② | 生食500mL  | ルートキープ             | 点滴   |                      |           |      |
| ③ | グラニセトロン3mg1バッグ<br>ホスアプレピタント1V<br>デカドロン3.3mg3A                            | 30分                | 点滴   |                      |           |      |
| ④ | キイトルーダ200mg<br>生食500mL<br>( )mg/body<br>最小単位10mg                         | 30分                | 点滴   |                      |           |      |
| ⑤ | ソルデム1 500mL<br>硫酸マグネシウム8mL<br>KCL10mL(0.5A)                              | 1時間                | 点滴   |                      |           |      |
| ⑥ | マンニトールS200mL(1Vから100mL捨てて)   | 30分                | 点滴   |                      |           |      |
| ⑦ | 生食250mL<br>ランダ60mg/m2<br>( )mg/body<br>#VALUE! 計算値<br>最小単位5mg            | 1時間                | 点滴   |                      |           |      |
| ⑧ | ソルデム1 500mL<br>KCL注10mL(0.5A)  | 1時間                | 点滴   |                      |           |      |
| ⑨ | デカドロン(0.5mg)8錠2×朝食後3日分<br>day2-4   |                    | 内服   |                      | day2-4で内服 |      |

day1

エスワン内服開始(2週間服用1週間休業)



スケジュール

