


指示者	@USERNAME
コース数	

身長	\$HEIGHT01_Doc	cm
体重	\$WHEIGHT01_Doc	kg
体表面積	#VALUE!	m ²

(DuBois式) 実施印

					day1	day2	day3
①	パンビタン末 1g 1×朝食後	連日内服	内服 ペメトレキセド投与1週間前から 連日内服、ペメトレキセド最終 投与から22日まで連日内服				
②	フレスミンS注 1A	9週間ごと	筋注 ペメトレキセド最終投与から22 日まで9週ごとに投与				
③	生食500mL	ルートキープ					
④	グラニセトロン3mgパック デカドロン3.3mg 3A ホスアブリピタント1V	30分	点滴				
⑤	ペメトレキセド* 500mg/m ² 生食 100mL ()mg/body #VALUE! 計算値	12分	ルートキープの生食でフ ラッシュ後 点滴				
⑥	ソルデム1 500mL 硫酸マグネシウム8mL KCL10mL(0.5A)	1時間					
⑦	マンニットール200mL(1Vから100mL捨てて)	30分					
⑧	ランダ 75mg/m ² 生食 250mL ()mg/body #VALUE! 計算値	2時間	点滴				
⑨	ソルデム1 500mL KCL10mL(0.5A)	1時間					
⑩	デカドロン(0.5mg)8錠2×朝食後3日分 day2~4		内服			day2~4に服用	



注意

ペメトレキセドは生理食塩水以外の輸液との配合は不可