

患者ID:@PATIENTID

2023.4.10作成

@PATIENTNAME 様 大腸化療(アービタックス+ビラフトビ+メクトビ)

2024.3.8改訂


指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_Do	cm
体重	VHEIGHT01_D	kg
体表面積	#VALUE!	m ²


実施印

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生理食塩水500mL	ルートキープ	点滴	
②	ポララミン注1A デカドロン注3.3mg2A 生食100mL	30分	点滴	
③	アービタックス 初回:400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² 生食250mL ()mg/body #VALUE! 初回の計算値 #VALUE! 2回目以降の計算値	初回120分 2回目以降60分	点滴	
④	経過観察	初回60分 2回目30分 3回目以降15分	経過観察	
⑤	ビラフトビカプセル50mg ()mg分1夕食後	別で処方をお願いします 通常1回300mgを1日1回	連日内服	
⑥	メクトビ錠15mg ()mg分2朝夕食後	別で処方をお願いします 通常1回45mgを1日2回	連日内服	

投与手順



スケジュール



注意

皮疹が強いときはアービタックス減量
皮膚乾燥にはヘパリン類似物質やウレバール
初回はインフュージョンリアクションに気をつける。