

患者ID:@PATIENTID

2024.7.25作 2024.7.27改訂

@PATIENTNAME 様 血液化療悪性リンパ腫 Pola-R-CHP(2回目以降)


指示者	@USERNAME
コース数	

身長	HEIGHT01_D	cm
体重	HEIGHT01_I	kg
体表面積	#VALUE!	m2

(DuBoisの式)

	薬物/実際の投与量	投与時間	投与経路	
①	生理食塩液250mL	ルートキープ	点滴	
②	カルナール錠300mg2錠 レスタミン錠10mg5錠		内服	
③	水溶性プレドニン注10mg10A 生食100mL	30分	点滴	
④	パロノセトロン1V ホスアプレピタント1V 生食100mL	30分	点滴	
⑤	リツキシマブ375mg/m ² 生食500mL(リツキサンを1mg/mLに調製する) ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	[2回目以降] 100mL/hで開始、30分ごとに 100mL/hずつ増加、最大 400mL/hまで可能	点滴	投与終了後に 薬剤科へTEL TEL後にボライ ビー調製開始
⑥	生理食塩液 50mL ドキソルビシン注用 50mg/m ² ()mg/body 最小単位5mg #VALUE! 計算値	30分	点滴	
⑦	5%糖液 250mL 注射用エンドキサン 750mg/m ² ()mg/body 最小単位10mg #VALUE! 計算値	30分	点滴	
⑧	生食50mL ボライビー1.8mg/kg 注射用水で調製 ()mg/body #VALUE! 計算値	30分	点滴	フィルター使用
⑨	プレドニン錠 100mg 2×朝・昼食後 ()mg/body		day2-5内服	day2-5内服

投与手順



スケジュール

